

Calendário Vacinal na Gestação



O objetivo da vacinação na gestação é proporcionar proteção para a gestante e para o feto. Portanto, mesmo em tempos de COVID-19, é essencial que as gestantes mantenham o calendário vacinal atualizado.

As vacinas Influenza, dTpa e Hepatite B são fundamentais na gestação.

REALIZAÇÃO:

**PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER**

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

Calendário Vacinal na Gestação

DTpa e/ou dT

→ São indicadas para proteção da gestante contra o tétano acidental e a prevenção do tétano, difteria e coqueluche neonatais.

→ Gestante não vacinada ou sem comprovação vacinal: administrar as duas primeiras doses de dT e a última dose de dTpa a partir da 20^a semana de gestação.

→ Esquema incompleto de dT (uma dose): administrar uma dose de dT e uma de dTpa a partir da 20^a semana de gestação.

REALIZAÇÃO:

PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

Calendário Vacinal na Gestação

DTpa e/ou dT

- **Esquema incompleto de dT (duas doses):** administrar uma dose de dTpa a partir da 20^a semana de gestação.
- **Esquema completo de dT (três doses):** administrar uma dose de dTpa a partir da 20^a semana de gestação.
- **O intervalo entre as doses deve ser entre 30 e 60 dias.**
- **A última dose ou reforço com dTpa deve ser administrado pelo menos 20 dias antes da data provável do parto.**

Calendário Vacinal na Gestação

INFLUENZA

- ➔ **A vacina protege contra o vírus da influenza e contra as complicações da doença (gripe), principalmente as pneumonias bacterianas secundárias.**
- ➔ **A vacina contra a gripe (Influenza) é a única que pode ser tomada em qualquer período da gestação e deve ser aplicada mesmo que a mulher já tenha sido vacinada na gravidez anterior.**
- ➔ **A vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas.**

REALIZAÇÃO:

**PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER**

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

Calendário Vacinal na Gestação

HEPATITE B

- ➔ **Gestante não vacinada ou sem comprovação vacinal: administrar três doses da vacina hepatite B com intervalo recomendado de 30 dias entre a 1º e a 2º dose e de 6 meses entre a 1º e a 3º dose.**
- ➔ **Esquema incompleto de hepatite B (uma dose): completar o esquema com duas doses da vacina hepatite B com intervalo mínimo de 2 meses entre as doses.**
- ➔ **Esquema incompleto de hepatite B (duas doses): completar o esquema com uma dose da vacina hepatite B.**

REALIZAÇÃO:

PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

Calendário Vacinal na Gestação

Vacinas que a gestante
NÃO pode tomar

- ➔ **Tríplice Viral – que combate o Sarampo, a Caxumba e a Rubéola.**
- ➔ **Varicela (Catapora).**
- ➔ **Febre Amarela.**
- ➔ **BCG (contra a Tuberculose).**

Essas vacinas são elaboradas a partir do vírus ou da bactéria (no caso da BCG) vivos e atenuados, por isso há o risco, mesmo que seja baixo, de a mulher grávida, que já está com a imunidade alterada por conta da gestação, desenvolver a doença.

REALIZAÇÃO:

PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020

Calendário Vacinal na Gestação

VACINA	HISTÓRICO VACINAL	CONDUTA NA GRAVIDEZ	CONDUTA NO PUÉRPÉRIO
dTpa – Tríplice Bacteriana do tipo adulto (Difteria, Tétano e Coqueluche)	Vacinação completa prévia (3 doses de vacina com componente tetânico)	Uma dose de dTpa (a partir de 20 semanas de cada gestação)	Uma dose de dTpa se não foi vacinada durante a gestação (de preferências nos primeiros 45 dias)
	Vacinação prévia incompleta (2 doses de vacina com componente tetânico)	Uma dose de dTpa (a partir de 20 semanas de cada gestação)	
	Vacinação prévia incompleta (1 dose de vacina com componente tetânico)	Uma dose de dT (no início da gestação) e uma dose dTpa (a partir de 20 semanas de Gestação)	
	Vacinação não realizada ou desconhecida	Duas doses de dT (no início da gestação com intervalo de um mês) e uma dose dTpa (a partir de 20 semanas de Gestação)	
Hepatite B	Vacinação completa – 3 doses	-----	-----
	Vacinação incompleta	Completar doses faltantes	Completar doses faltantes
	Vacinação não realizada ou desconhecida	Três doses (0-1-6 meses)	
Influenza (gripe)	Vacinação não realizada ou desconhecida	Vacinação anual (sazonal)	Vacinar no puerpério se não se vacinou na gravidez

REALIZAÇÃO:

PROGRAMA
DE EXTENSÃO
PRÓ MULHER

PROEX UERN



FONTES:

- FEBRASGO, 2020;
- UFRGS, 2018;
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020